

DEFENCE

DISPOSITIVO MEDICO PER IL TRATTAMENTO DEL **REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO ACIDO**, NON ACIDO E PER LA PROTEZIONE DELL'ESOFAGO

COMPRESSA ANTIREFLUSSO DA SCIOGLIERE IN BOCCA

La malattia da reflusso gastro-esofageo indicata anche con MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è una malattia funzionale, associata a un insieme di sintomi tipici, quali:

- · bruciore al petto (pirosi retrosternale),
- rigurgito acido o alcalino da posizione, da sostanze alimentari o irritanti che facilitano il reflusso (alcolici, caffè, thè, cioccolato, agrumi)
- cramp
- sensazione di difficoltà a deglutire non dolorosa (disfagia)
- tosse irritativa
- disfonia (raucedine, afonia)

I sintomi possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. Un regime alimentare non corretto o uno stile di vita frenetico possono condizionare in maniera importante la produzione di succhi gastrici, aumentando l'acidità gastrica e provocando quella fastidiosa e dolorosa sensazione di bruciore, soprattutto dopo i pasti. Questa eccessiva acidità può essere avvertita anche all'altezza della bocca dello stomaco, con sensazioni di bruciore, crampi, gonfiore, nausea e pesantezza. La MRGE può manifestarsi anche durante il riposo notturno, in quanto la posizione supina favorisce la risalita del succo gastrico nell'esofago, che è sprovvisto di parete adatta a sopportare l'acidità qastrica, con consequente comparsa di bruciore a livello del torace.

INDICAZIONI

ESOXX DEFENCE è un dispositivo medico ad azione meccanica che trova indicazione:

- nel trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo.
 Riduce rapidamente i sintomi correlati quali: Bruciore gastrico (pirosi),
 Rigurgito acido, Dolore epigastrico, Tosse irritativa, Disfonia.
- nel trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore di stomaco occasionale).

ESOXX DEFENCE è un'associazione originale e innovativa di Condroitin-Solfato, Acido laluronico e Alluminio idrossido.

ESOXX DEFENCE contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione irritante dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco.



La **presentazione in compresse** da sciogliere inizialmente in bocca, stimola la salivazione, che permette un miglior contatto dei componenti con la parete esofagea e ne favorisce la protezione e la lubrificazione.



Il **Condroitin-Solfato**, aderendo alla mucosa gastro-esofagea, la protegge isolandola efficacemente dall'attacco dei succhi gastrici.



L'**Acido Ialuronico**, in combinazione con le proprietà adesive del Condroitina Solfato, protegge il tessuto dell'esofago danneggiato e ne favorisce la reintegrazione.



L'Alluminio idrossido svolge la funzione di antiacido, riducendo l'aggressività dei succhi gastrici nei confronti della mucosa danneggiata.

COMPOSIZIONE

Condroitina solfato sale sodico, saccarosio, alluminio idrossido, calcio carbonato; antiagglomeranti: mono-ditri-gliceridi degli acidi grassi, biossido di silicio, sodio ialuronato ad alto peso molecolare; aroma; edulcorante: ammonio glicirizzinato.

CONFEZIONE

20 compresse da sciogliere in bocca da 1100 mg.

DOSI E MODALITÀ D'USO

DOSI: Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1-2 compresse dopo i pasti principali e prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco, secondo consiglio medico.

Bambini sopra i 6 anni: si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il proprio Medico curante. 1 compressa, dopo i pasti principali e/o prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco. In caso di necessità, la compressa può essere divisa a metà, mediante la linea di prefrattura.

MODALITÀ D'USO: Le compresse vanno inizialmente sciolte in bocca e successivamente masticate. La loro assunzione può essere anche seguita dall'ingestione di acqua o latte.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso se prolungato del prodotto, per l'azione astringente dell'Alluminio, può causare stitichezza.

CONTROINDICAZIONI

Insufficienza renale. Ipofosfatemia. Ipersensibilità nota verso uno dei componenti.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Utilizzare il prodotto dopo aver consultato il proprio Medico.

AVVERTENZE

Il prodotto non contiene glutine, lattosio e derivati. Il prodotto contiene alluminio, che potrebbe interferire con l'assunzione contemporanea di farmaci, i citrati possono aumentare l'assorbimento di alluminio. È opportuno non assumere farmaci 1 ora prima e 2 ore dopo l'impiego del prodotto e solo dopo aver consultato il proprio medico. Non eccedere la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico.

Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.









Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italia

Distributore per l'Italia Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5

40133 Bologna (BO) Italia



Fabbricante SOFAR SWISS SA

Via Nassa, 3 - 6900 Lugano (SVIZZERA/SWITZERLAND) Phone +41 919232266 info@sofarswiss.ch www.sofarswiss.com



Rev. 07 01/2023